



STODAL®

GRANULES

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 jours.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

- 1- Qu'est-ce que **STODAL, granules** et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **STODAL, granules** ?
- 3- Comment prendre **STODAL, granules** ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver **STODAL, granules** ?
- 6- Contenu de l'emballage et autres informations.

1- QU'EST-CE QUE STODAL, granules ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicament homéopathe.

Médicament homéopathe traditionnellement utilisé dans le traitement de la toux.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE STODAL, granules ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais STODAL, granules : si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissement et précautions

Compte tenu de la présence de PULSATILLA

3 CH dans la formule, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'otite ou de sinusite, sans avis médical.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

STODAL, granules contient du saccharose et du lactose.

3- COMMENT PRENDRE STODAL, granules ?

Posologie

Laisser fondre sous la langue 5 granules toutes les heures. Espacer les prises selon amélioration.

La durée du traitement est limitée à une semaine, cependant, l'absence d'amélioration au bout de 3 jours devra amener à consulter un médecin.

Mode d'administration

Voie orale.

Chez l'enfant de moins de 6 ans, dissoudre les granules dans un peu d'eau.

Si vous avez pris plus de STODAL, granules que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre STODAL, granules :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance

Site internet : www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5- COMMENT CONSERVER STODAL, granules ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois. Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments

que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6- CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient STODAL, granules

Les substances actives sont :

Pulsatilla	3 CH
Rumex crispus	6 CH
Bryonia	3 CH
Ipeca	3 CH
Sticta pulmonaria	3 CH
Spongia tosta	3 CH
Antimonium tartaricum	6 CH
Mycarde	6 CH
Coccus cacti	3 CH

Les autres composants sont : saccharose, lactose.

Qu'est ce que STODAL, granules et contenu de l'emballage extérieur

STODAL se présente sous la forme de granules. Ils sont conditionnés dans une boîte contenant 2 tubes de 4 g.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy - France

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy - France

Fabricant BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy - France

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est décembre 2016.

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

Boiron cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine. Boiron participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non.

Boiron vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

